

# Avertissements agricoles

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITÉ

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B. P. 95 - 84140 MONTFAVET


Téléphone (90) 88.21.83

DLP 25-4-84-05953



ISSN 0759-9616

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR



- ARBORICULTURE - CULTURES LEGUMIERES - GRANDES CULTURES -

10 Avril 1985 - N°6 BIS

## CEREALES

### STADES PHENOLOGIQUES - Tallage à un noeud

Les stades phénologiques sont très variés en fonction des dates de semis qui ont été étalées avec les pluies puis le froid.

Les parcelles les plus précoces c'est-à-dire semées fin Octobre pour le blé dur en zone de Camargue, plaine de Beaucaire-Tarascon et pour la variété Prinqual en plaine d'Orange-Pierrelatte sont au stade 6.

### MALADIES DES CEREALES -

Situation phytosanitaire observée dans la région à ce jour : BONNE dans l'ensemble.

. *Fusariose* : fréquente sur blé dur mais superficielle.

. *Rhizoctone* : observé ponctuellement.

Aucune préconisation fiable ne peut être faite pour ces deux parasites.

. *Piétin verse* : observé très rarement.

. *Rouille brune* : présence des toutes premières pustules sur F 4 (variétés : Arcour, Prinqual, Mondur) dans quelques parcelles avancées en Camargue et plaine d'Orange-Pierrelatte.

. *Septoria tritici* et *Oïdium* sur F 4 sont également observés sur les parcelles précoces de variété Prinqual en plaine de Pierrelatte.

DONC = - pas de traitement justifié à ce jour (situation sanitaire satisfaisante, stade trop précoce).

- surveillez particulièrement les parcelles précoces de variété Prinqual.

Premier stade clef de lutte contre les maladies des céréales - stade 1 à 2 noeuds.

. Prélevez 40 brins maîtres au hasard dans la parcelle.

. Recherchez - les maladies du pied (*Fusariose*, *Piétin verse*, *Rhizoctone*)  
- les maladies foliaires précoces (*Rouille*, *Septoriose*).

. Consultez notre tableau d'aide à la décision ou votre technicien. (tableau au verso)

Liste non exhaustive des produits utilisables :

1/ - Maladies du pied essentiellement :

produits à base de bénomyl, carbendazime, thiophanate-méthyl associés à du manèbe ou du mancozèbe (nombreuses spécialités).



2/ - Rouille jaune - Rouille brune :

IMPACT SOPRA, BAYFIDAN, CORBEL, TILT 125.

Produits polyvalents : Oïdium, Rouille, Septoriose : CORBEL STAR, IMPACT SOPRA, BAYFIDAN D, VIGIL T.

Produits complets : Maladies du pied : Oïdium, Rouille, Septoriose : TILT C, TILT SP, CORVET CM, BAYLETON triple, CORBEL duo, IMPACT R SOPRA.  
...../.....



STADE DU BLE	OBJECTIF DE RENDEMENT FAIBLE	OBJECTIF DE RENDEMENT ELEVE Blé dur (supérieur à 45 q) Florence Aurore (supérieur à 40 q) Prinqual (supérieur à 50 q)
 <p>REDRESSEMENT 1 NOEUD - STADE 6</p>	<p>.Si plus d'une tige sur 5 atteintes de maladies du pied contactez votre technicien.</p> <p>.Si quelques pustules de <i>Rouille brune</i> il n'y a pas de risques à ce stade .</p> <p>.Si aucune maladie revenez observer au stade 2 noeuds .</p>	<p>.Si plus d'une tige sur 5 atteintes de maladies du pied contactez votre technicien .</p> <p>. Si quelques pustules de <i>Rouille brune</i> il n'y a pas de risques à ce stade .</p> <p>. Si aucune maladie revenez observer au stade 2 noeuds</p>
 <p>2 NOEUDS - STADE 7</p>	<p>.Ne traitez qu'en cas de <i>Rouille jaune</i> avec 2 .</p> <p>.Si quelques pustules de <i>Rouille brune</i> revenez impérativement au début gonflement .</p> <p>.Si aucune maladie revenez observer au début du gonflement .</p>	<p>. Si plus d'une tige sur 5 atteintes de maladies du pied et pas de <i>Rouille</i> traitez avec 1 .</p> <p>. Si <i>Rouille jaune</i> seule traitez avec 2 .</p> <p>. Si quelques pustules de <i>Rouille brune</i> revenez impérativement observer au stade début gonflement .</p> <p>. Si aucune maladie revenez observer au début gonflement .</p>

#### DESHERBAGE -

- A partir du redressement, utilisez SUFFIX 425 contre les graminées (folle avoine, vulpin) .Ne pas le mélanger avec des produits complets antidicotylédones. Seul le MCPA peut être mélangé .

- Pour le désherbage antidicotylédones, *respectez* le stade de la céréale et *vérifiez* le stade de la mauvaise herbe : si celle-ci est développée, préférez des produits à base d'hormones: MCPA, MCPP, 2-4 D qui sont des herbicides systémiques .

### Maïs

Choisissez votre désherbant et protégez votre semis contre les ravageurs du sol . Voir notre bulletin N°5 .

### Tournesol

#### Traitement insecticide du sol :

Le principal ravageur à redouter est le *Taupin* .Luttez soit par un traitement en plein avec du lindane, 15 jours avant le semis, à la dose de 1500 g de M.A./ha, soit en localisation avec des produits plus polyvalents .Dans ce cas, choisir les produits les moins chers et les utiliser à des doses légèrement plus élevées que le maïs .

#### Limaces :

Les dégâts sont souvent faibles mais en cas de forte attaque traitez avec des produits à base de mercaptodiméthur (MESUROL) ou de métaldéhyde .